

HPV

— vaccination —

预防HPV感染, 帮助降低您的患癌风险



通用的人类乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗

免疫接种计划

HPV疫苗被提供给所有就读8年级的女孩超过十年。从2019年9月疫苗也开始被提供给就读8年级的男孩。

这是因为证据表明, HPV疫苗有助保护男孩和女孩预防患上与HPV相关的癌症。

HPV疫苗有助保护您免受 人类乳头瘤病毒(HPV)的感染。

这种病毒会增加日后患上某些癌症的风险, 例如:

- 宫颈癌
- 一些口腔癌和咽喉癌
- 一些肛门和生殖器部位的癌症

HPV疫苗不能预防其它性传播感染。


人类乳头瘤病毒

以及其传播方式


人类乳头瘤病毒
(HPV) 感染十分常见。
超过70%未接种疫苗
的人会感染该病毒

70%

HPV 存活在整个
生殖器内及
周围的皮肤上，
所以，使用安全套并
不能完全预防受 HPV
感染



HPV 有许多不同类型



大多数 HPV 感染不引起
任何症状，并且自行痊愈



有些感染不会自行消失
并可致癌，而另一些
感染则会引起生殖器
尖锐湿疣



迄今为止, HPV疫苗起到了什么作用?

全球已有超过8千万人接种了这种疫苗。

随着时间的推移, 预计这种疫苗每年将在英国拯救数百人的生命。苏格兰最近的一项研究表明, 年轻女性中的癌前宫颈疾病降低了71%。

自英国实施疫苗接种计划以来, 患有尖锐湿疣的年轻人人数已大大减少。

接种HPV疫苗

在您的手臂上注射疫苗, 您需要接种两剂才能受到完全的保护。

第一剂接种是在8年级, 第二剂接种通常是在6到12个月后。您会在第二剂到期接种时接到通知。

为能让您有最好的保护,疫苗应该在您开始有性行为之前接种。

如果您已经开始有性行为,则应该继续接种疫苗。



如果我在15岁之前还没有接种第一剂HPV疫苗, 怎么办?

如果您在15岁之前仍没有接种过任何HPV疫苗, 则您将需要接种三剂。这是因为较年长的女孩和男孩对两剂疫苗的反应不是太理想。

第二剂会在第一剂之后一个月左右接种, 最后一剂则是在第一剂之后六个月左右接种。

如果您错过了您的疫苗接种, 则应该告知免疫接种小组或您的全科医生(GP), 尽快预约接种疫苗。

我错过了我的疫苗接种, 我还可以接种吗?

可以。如果错过了在学校接种任何一剂疫苗, 您还是可以在25岁之前进行疫苗接种。尽快联系您的驻校护士或全科医生诊所。



接种过疫苗的女性仍将需要进行宫颈癌筛查

在英格兰,所有25岁或以上的女性都可以接受宫颈癌筛查检验。

这种疫苗可预防将近70%的宫颈癌病例,但仍需要进行筛查看看是否有其它宫颈异常情况。

那其它癌症呢?

目前还没有针对其它与HPV相关的癌症的筛查计划。如果您担心患有其它病症,请与您的全科医生谈谈。

更多关于疫苗
副作用的详情
或想查阅疫苗的
患者信息手册,
请访问网页
www.nhs.uk/hpv



紧记



您的两剂HPV疫苗接种时间至少要相隔6个月



现在就接种您的HPV疫苗, 预防自己在将来患上多种癌症



随着时间的推移, 预计这种疫苗每年将在英国拯救数百人的生命。

更多详情请访问网页

www.nhs.uk/hpv

完整的疫苗成分列表刊登在：
患者信息手册 (Patient Information Leaflet, 简称PIL)：

www.medicines.org.uk/emc/medicine/19033

产品特征总结 (The Summary of Product Characteristics, 简称SPC)：

www.medicines.org.uk/emc/medicine/19016/SPC/gardasil/



本手册由英格兰公共卫生部制作。

免疫接种, 有助保护每个年龄段的每一个人。